



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

کد دانش آموز:

نوبت: دوم  
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

اداره آموزش و پرورش شهرستان سیمرغ استان مازندران

تاریخ امتحان:

طراح: فاطمه یوسف زاده






رشته: ریاضی

پایه: یازدهم

نام درس: هندسه ۲

صفحه:

ردیف	سوال	نمره
۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) در حالت کلی انتقال ، شیب خط را حفظ می کند. ص غ ب) بازتاب، تبدیل همانی است. ص غ	۰/۵
۲	جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید. الف) اگر نقطه ای بیرون دایره باشد، فاصله آن تا مرکز دایره ..... شعاع دایره است. ب) دو دایره را که تمام نقاط یکی درون دیگری باشد، دو دایره ..... می نامیم.	۰/۵
۳	گزینه درست را با علامت مشخص کنید. الف) شرط اینکه تجانس طولها باشد با نسبت تجانس $K$ ، این است که..... ۱) $K = 1$ ۲) $K = 1$ ۳) $ K  = 1$ ۴) $K > 1$ ب) کدام تبدیل، مساحت شکل را حفظ نمی کند. ۱) دوران      ۲) تجانس      ۳) انتقال      ۴) بازتاب	۰/۵
۴	قضایای زیر را ثابت کنید. الف) اندازه هر زاویه ظلی برابر است با نصف کمان روبه رو به آن زاویه. ب) در هر تبدیل طولی، تبدیل یافته هر زاویه ، زاویه ای هم اندازه آن است. ج) تجانس، شیب خط را حفظ می کند. د) در هر مثلث دلخواه مانند $ABC$ ، نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبه رو به آن برابر است با طول قطر دایره محیطی مثلث. ( $\hat{A} > 90^\circ$ ). ه) در هر مثلث، نیمساز هر زاویه داخلی، ضلع روبه رو به آن زاویه را به نسبت اندازه های ضلع های آن زاویه تقسیم می کند.	۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۵	دایره $C(O, R)$ مفروض است. از نقطه $M$ در خارج دایره خطی چنان رسم کرده ایم که دایره را در دو نقطه $A$ و $B$ قطع کرده است و $MA = R$ . نشان دهید $\beta = 3\alpha$ . 	۱
۶	طول شعاع های دو دایره متخارج را به دست آورید که طول مماس مشترک خارجی آن ها مساوی 6 و طول مماس مشترک داخلی آن ها $\sqrt{11}$ و طول خط المکزین آن ها مساوی $3\sqrt{5}$ واحد باشد.	۱
۷	یک ذوزنقه، هم محیطی است و هم محاطی. ثابت کنید مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده آن ضرب در میانگین هندسی آن ها.	۱/۵
۸	نشان دهید دوران تبدیل طولی است در حالتی که مرکز دوران $O$ بر پاره خط $AB$ و امتداد آن واقع نباشد و زاویه دوران از زاویه $\hat{AOB}$ بیشتر باشد.	۱
۹	الف) آیا در یک انتقال غیر همانی می توان نقاط ثابت تبدیل داشت؟ چرا؟ ب) اگر $n$ ضلعی $A'_1 A'_2 \dots A'_n$ مجانس $n$ ضلعی $A_1 A_2 \dots A_n$ باشد، نشان دهید این دو $n$ ضلعی با هم متشابه هستند.	۲

۱	<p>اگر دو شهر <math>A</math> و <math>B</math> دو طرف رودخانه باشند و بخواهیم جاده ای از <math>A</math> به <math>B</math> بسازیم به طوری که پل <math>MN</math> بر راستای رودخانه عمود باشد، محل احداث پل را کجا در نظر بگیریم که مسیر <math>AMNB</math> کوتاه ترین مسیر ممکن باشد؟</p> 	۱۰
۱	<p>ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه <math>ABC</math> (<math>A = 90^\circ</math>) با ارتفاع <math>AH = h_a</math> داریم: <math>\frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}</math></p>	۱۱
۱	<p>دو قایق از یک نقطه در دریاچه ای با سرعت های <math>60\text{km/h}</math> و <math>100\text{km/h}</math> و با زاویه <math>120^\circ</math> از هم دور می شوند. نیم ساعت بعد دو قایق در چه فاصله ای از یکدیگر هستند؟</p> 	۱۲
۱/۲۵	<p>در مثلث متساوی الاضلاع <math>ABC</math> به ضلع <math>8</math> واحد، نقطه <math>D</math>، که به فاصله <math>7</math> واحد از راس <math>A</math> قرار دارد از <math>B</math> و <math>C</math> چه فاصله ای دارد؟ نقطه <math>E</math> (<math>CD &gt; BD</math>) که به فاصله <math>5</math> واحد از <math>C</math> قرار دارد از <math>D</math> به چه فاصله ای است؟</p> 	۱۳
۱/۵	<p>در مثلث <math>ABC</math>، <math>AB = 4</math>، <math>AC = 5</math> و <math>BC = 8</math> است. طول نیمساز زاویه <math>A</math> را بیابید.</p> 	۱۴
۱/۲۵	<p>در شکل مقابل، مساحت چهار ضلعی <math>DECB</math> را بیابید.</p>  <p style="text-align: center;">موفق باشید</p>	۱۵


	با عدد	نمره تجدید نظر		با عدد	نمره ورقه
	با حروف			با حروف	
تاریخ:		نام دبیر و امضاء :	تاریخ:		نام دبیر و امضاء :

۱- اگر زاویه ظلی حاده باشد :

اثبات: از  $A$  ، قطر  $AD$  را رسم می کنیم در این صورت  $\widehat{DAC} = 90^\circ$  و در نتیجه  $\widehat{DAC} = \frac{1}{2} \widehat{AD}$  (۱). از طرفی زاویه  $DAB$  یک زاویه محاطی است. در

نتیجه:  $\widehat{DAB} = \frac{1}{2} \widehat{DB}$  (۲).


$$(1)-(2) = \widehat{DAC} - \widehat{DAB} = \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BD}) \Rightarrow \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \widehat{AB}$$




۲- اگر زاویه ظللی منفرجه باشد:

اثبات:  $\widehat{DAC} = 90^\circ$  و در نتیجه  $\widehat{DAC} = \frac{1}{2} \widehat{AD}$  (۱). از طرفی زاویه  $DAB$  یک زاویه محاطی است. در نتیجه:  $\widehat{DAB} = \frac{1}{2} \widehat{DB}$  (۲).

$$(1)+(2) = \widehat{DAC} + \widehat{DAB} = \frac{1}{2}(\widehat{AD} + \widehat{BD}) \Rightarrow \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \widehat{AB}$$



(ب) می خواهیم نشان دهیم هر تبدیل طولیا اندازه زاویه را حفظ می کند . فرض کنید  $T$  تبدیلی طولیاست.



$A\hat{O}B = \alpha$  و  $T(O) = O'$  و  $T(B) = B'$  و  $T(A) = A'$  حال دو مثلث  $AOB$  و  $A'O'B'$  را در نظر می گیریم:

$$AB = A'B'$$

$$OA = O'A' \Rightarrow \overset{\text{ضضض}}{\triangle AOB} \cong \triangle A'O'B' \Rightarrow A\hat{O}B = A'\hat{O}B' = \alpha$$

$$OB = O'B'$$


(ج) دو حالت زیر را در نظر می گیریم:

(۱) نقطه  $O$  روی خط  $AB$  است.


در این حالت بدیهی است که نقاط  $A'$  و  $B'$  مجانس های نقاط  $A$  و  $B$  روی خط  $AB$  واقع می شوند، بنابراین  $A'B'$  بر  $AB$  واقع است و شیب خط تغییری نمی کند.

(۲) نقطه  $O$  غیر واقع بر خط  $AB$  است. در این صورت اگر نقاط  $A'$  و  $B'$  به ترتیب مجانس های  $A$  و  $B$  باشند، طبق تعریف داریم:

در نتیجه:  $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = K$  بنابراین  $AB \parallel A'B'$ . پس در این حالت نیز خط و تصویرش با هم موازیند و شیب دو خط با هم برابر است.



(د) اثبات: نقطه دلخواه  $A'$  روی کمان  $BC$  را به  $B$  و  $C$  وصل می کنیم. زوایای  $\hat{A}$  و  $\hat{A}'$  نسبت به هم مکمل هستند چون:



$$\hat{A} = \frac{\widehat{BA'C}}{2}, \hat{A}' = \frac{\widehat{BAC}}{2} \Rightarrow \hat{A} + \hat{A}' = \frac{\widehat{BA'C}}{2} + \frac{\widehat{BAC}}{2} = \frac{360}{2} = 180 \Rightarrow$$

$$\hat{A} + \hat{A}' = 180$$

بنابراین زاویه  $\hat{A}'$  حاده است. از طرفی:  $\sin A = (180^\circ - A') = \sin \hat{A}'$  در مثلث  $A'BC$  بنا بر قضیه ای داریم:  $\frac{a}{\sin A'} = 2R$  در نتیجه:

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$

(ه) اثبات: از نقطه  $C$  خطی موازی نیمساز  $AD$  رسم می کنیم تا امتداد  $AB$  را در نقطه  $E$  قطع کند. در این صورت داریم:

از طرفی طبق قضیه تالس در مثلث  $(AD \parallel EC)EBC$  داریم:


$$AD \parallel EC \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{E}$$

در نتیجه چون  $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$  بنابراین:  $\hat{E} = \hat{C}$ . در این صورت مثلث  $AEC$  متساوی الساقین است.


$$AD \parallel EC \Rightarrow \hat{A}_2 = \hat{C}$$

از طرفی طبق قضیه تالس در مثلث  $(AD \parallel EC)EBC$  داریم:

$$AD \parallel EC \Rightarrow \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AE} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$



۵- با توجه به فرض مسئله، مثلث های  $OAB$  و  $OAM$  متساوی الساقین هستند. در مثلث  $OBM$  داریم:  $\beta = 2\alpha + \alpha = 3\alpha$



-۶

$$TT'^2 = d^2 - (R - R')^2 \Rightarrow 36 = 45 - (R - R')^2 \Rightarrow R - R' = 3$$

$$TT'^2 = d^2 - (R + R')^2 \Rightarrow 11 = 36 - (R + R')^2 \Rightarrow R + R' = 5$$

$$\Rightarrow R = 4, R' = 1$$


۷- چون دوزنقه  $ABCD$  محاطی است، پس متساوی الاضلاع است و چون محیطی است مجموع دو ضلع مقابل دیگر برابر است. در نتیجه  $2b = a + b$  و مثلث  $ADF$  قائم الزاویه است.

$$2c = a + b \Rightarrow c = \frac{a + b}{2}$$


$$b = 2x + a \Rightarrow x = \frac{b - a}{2}$$

$$h^2 = c^2 - x^2 \Rightarrow h^2 = \left(\frac{a + b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b - a}{2}\right)^2 \Rightarrow h^2 = \frac{4ab}{4} \Rightarrow h = \sqrt{ab}$$

$$s_{ABCD} = \frac{1}{2}(a + b) \times \sqrt{ab}$$



۸- با توجه به شکل  $\hat{A}OB = \hat{A}'OB' \Rightarrow O_1 + O_2 = O_3 + O_2 = \alpha$ . از طرفی به کمک هم نهشتی مثلث ها داریم:



$OB = OB'$  لذا دو مثلث  $AOB$  و  $A'OB'$  بنابه حالت ض ض با هم همنهشت هستند در نتیجه:  $AB = A'B'$

$$OA = OA'$$

$$\hat{A}OB = \hat{A}'OB'$$


۹- الف) خیر نمی توان نقاط ثابت داشت یا به عبارتی هر نقطه باید تحت یک بردار غیر صفر در صفحه بلغزد و نمی تواند بر روی خودش بلغزد.

ب) فرض کنیم  $A_1 A_2 \dots A_n$  یک ضلعی  $n$  ضلعی و نقطه  $O$  مرکز تجانس و  $K$  نسبت تجانس باشد و چند ضلعی  $A'_1 A'_2 \dots A'_n$  مجانس آن باشد. بنا بر تعریف تجانس

داریم:  $OA'_1 = |K|OA_1$  و  $OA'_2 = |K|OA_2$  و ...  $OA'_n = |K|OA_n$   $\Leftrightarrow \frac{OA'_1}{OA_1} = \frac{OA'_2}{OA_2} = \dots = \frac{OA'_n}{OA_n} = |k|$  پس چون اضلاع همه متناسب هستند بنا

بر قضیه ۳ تشابه نتیجه می گیریم که این دو چند ضلعی متشابهند.

۱۰- نقطه  $B$  را تحت برداری مساوی وعمود بر راستای رودخانه در جهت شهر  $A$  به نقطه  $B'$  انتقال می دهیم. سپس از  $B'$  به  $A$  وصل می کنیم تا نقطه  $M$  به دست آید. از نقطه  $M$  بر رودخانه عمود می کنیم تا نقطه  $N$  به دست آید. به این ترتیب محل احداث پل  $MN$  به دست آید به طوری که مسیر  $AMNB$  کوتاه ترین مسیر است.  $AMB'B = AM + MB' + B'B \Rightarrow AM + NB + MN = AMNB$




۱۱-

$$bc = ah_a \Leftrightarrow S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \text{ و } S = \frac{1}{2} bc$$

$$(bc)^2 = (ah_a)^2 \Rightarrow b^2 c^2 = a^2 h_a^2 \Rightarrow b^2 c^2 = (b^2 + c^2) h_a^2 \Rightarrow b^2 c^2 = b^2 h_a^2 + c^2 h_a^2 \div b^2 c^2 h_a^2$$

$$\frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2}$$



۱۲- به کمک قضیه کسینوس ها طول ضلع خواسته شده را به دست می آوریم.  $OA = 60 \times 0/5 = 30, OB = 100 \times 0/50 = 50$


$$BC^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow 900 + 2500 - 2 \times 30 \times 50 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 4900 \Rightarrow$$

$$AB = 70km$$

$$7^2 = x^2 + 8^2 - 2 \times x \times 8 \times \cos 60^\circ \Rightarrow 49 = x^2 + 64 - 8x \Rightarrow$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \Rightarrow (x-5)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 5, x = 3, \underline{BD < DC}, BD = 3, DC = 5 \text{ -۱۳}$$


چون  $DC = CE = 5$  در نتیجه مثلث  $DCE$  متساوی الساقین است و چون یک زاویه  $60^\circ$  درجه دارد پس متساوی الاضلاع است یعنی  $DE = 5$ .



$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{BD+CD}{CD} = \frac{9}{5} \Rightarrow \frac{8}{CD} = \frac{9}{5} \Rightarrow CD = \frac{40}{9}$$

-۱۴

$$BD = 8 - \frac{40}{9} = \frac{32}{9}$$



۱۵- با توجه به این که مثلث  $ADE$  متساوی الساقین است پس  $\hat{DAE} = 60^\circ$  در نتیجه:

$$S_{BCED} = S_{ABC} - S_{ADE}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$$

$$S_{ADE} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (1)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{BCED} = 12\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{47}{4}\sqrt{3}$$

